


SZKOŁA PODSTAWOWA HELIANTUS  
02-892 WARSZAWA  
ul. BAŻANCIA 16

TEMAT 11.1: FUNKCJE WYMIERNE,

10 godzin lekcyjnych po 45 minut

Tadeusz STYŚ




.Warszawa czerwiec 2023

# Contents

<b>1</b>	<b>Funkcje wymierne</b>	<b>3</b>
1.1	Określenie funkcji wymiernej . . . . .	3
1.2	Przykłady funkcji wymiernych . . . . .	4
1.2.1	Hyperbola . . . . .	4
1.2.2	Rozkład funkcji wymiernych na ułamki proste . . . . .	8
1.3	Zadania . . . . .	9

# Chapter 1

## Funkcje wymierne



### 1.1 Określenie funkcji wymiernej

Naturalnym rozszerzeniem pojęcia wielomianów są funkcje wymierne. Mianowicie, iloraz wielomianów

$$w(x) = \frac{p_n(x)}{q_m(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0}, \quad q_m(x) \neq 0 \quad (1.1)$$

stopni  $n$  i  $m$  jest funkcją wymierną.

Zauważmy, że jeżeli mianownik  $q_m(x) = \text{constant} \neq 0$  jest liczbą różną od zera, to funkcja wymierna jest wielomianem stopnia  $n$ .

Zatem dziedziną funkcji wymiernych  $w(x)$  jest zbiór tych liczb rzeczywistych

$$x \in R = (-\infty, \infty),$$

dla których mianownik  $q_m(x) \neq 0$  jest różny od zera, piszemy

$$\text{Dziedzina } w(x): D = \{x \in (-\infty, \infty) : \text{takich ze } q_m(x) \neq 0\}$$

## 1.2 Przykłady funkcji wymiernych

Niżej rozpatrzmy kilka przykładów standardowych funkcji wymiernych.

### 1.2.1 Hyperbola

Najprostrzą funkcją wymierną jest hyperbola w położeniu kanonicznym na płaszczyźnie kartezjańskiej w układzie współrzędnych  $x, y$

$$y = \frac{1}{x}, \quad y = w(x) \quad x \neq 0$$

Podamy następujące własności tej hyperboli, którą dalej oznaczamy  $y = w(x)$  :

1. dziedzinę,
2. zbiór wartości,
3. asymptoty hyperboli  $y = w(x)$ ,
4. wykres hyperboli  $y = w(x)$ .


Dziedziną funkcji wymiernej  $w(x)$  jest zbiór liczb rzeczywistych różnych od zera.

$$\text{Dziedzina funkcji } w(x): D = \{x \in (-\infty, \infty) : x \neq 0.\}$$

Zbiorem wartości funkcji wymiernej  $w(x)$  jest również zbiór liczb rzeczywistych różnych od zera bez punktu  $x = 0$ , gdyż  $\frac{1}{x} \neq 0$  jest określona dla  $x \neq 0$ .

$$\text{Zbiór wartości funkcji } y = w(x): \{y \in (-\infty, \infty), \text{ takich ze } x \neq 0 \text{ i } y \neq 0.\}$$

Zatem funkcja  $w(x)$  nie osiąga wartości zero,  $w(x) \neq 0$  dla wszystkich wartości argumentu  $x \neq 0$  dla których jest określona. Wykres Hyperboli w postaci kanonicznej



Zauważmy, że ta hyperbola ma dwie asymptoty poziomą oś  $x$  i pionową oś  $y$ .

Istotnie, gdy argument  $x$  dąży do dodatniej lub ujemnej nieskończoności, piszemy

$$x \rightarrow \pm\infty$$

to wartości hyperboli dążą do zera

$$w(x) = \frac{1}{x} \rightarrow 0, \quad \text{gdy } x \rightarrow \pm\infty$$

**Przykład 1.1** Rozpatrzmy funkcję wymierną

$$y = \frac{x-1}{x+1}, \quad y = w(x) \quad x \neq -1.$$

Dla tej funkcji wymiernej, którą dalej oznaczamy  $y = w(x)$ , znajdziemy

1. dziedzinę,
2. zbiór wartości,
3. rozłóż funkcję  $y = w(x)$  na ułamki proste,
4. asymptoty asymptoty funkcji  $y = w(x)$ ,
5. wykres funkcji  $y = w(x)$ .

Dziedziną tej funkcji wymiernej jest zbiór liczb rzeczywistych dla których mianownik

$$x + 1 \neq 0$$

jest różny od zera.

Jasne, że mianownik jest różny od zera dla  $x \neq -1$ . Zatem, zbiorem określoności funkcji wymiernej  $w(x)$  jest zbiór zwany dziedziną

$$\text{Dziedzina } y = w(x) : D = \{x \in (-\infty, \infty) \text{ takich, że } x \neq -1.\}$$

Funkcję wymierną  $w(x)$  łatwo zapiszemy w postaci ułamków prostych. Mianowicie, dodając i odejmując w liczniku liczbę 2, sprawdzamy, że

$$\begin{aligned} y = w(x) &= \frac{x-1}{x+1} \\ &= \frac{x-1+2-2}{x+1} \\ &= \frac{(x+1)-2}{x+1} \\ &= 1 - \frac{2}{x+1}, \quad x \neq -1. \end{aligned}$$

Zbiorem wartości funkcji

$$y = w(x) = 1 - \frac{2}{x+1} \neq 1, \quad x \neq -1.$$

jest zbiór liczb rzeczywistych różnych od 1.

$$\text{Zbiór wartości funkcji } y = w(x) = \{w \in (-\infty, \infty), \text{ takich, że } w \neq 1\}$$

Ponadto funkcja wymierna  $w(x)$  osiąga wszystkie wartości rzeczywiste różne od 1.

**Asymptoty funkcji  $y = w(x)$ :**

Asymptotą poziomą jest prosta równoległa do osi  $x$

$$y = w(x) = 1 \text{ dla wszystkich rzeczywistych } x \neq -1.$$

Jeżeli  $x$  dąży do nieskończoności dodatniej lub ujemnej to wartości funkcji  $w(x)$  dążą do 1.


$$\text{Jeżeli } x \rightarrow \pm\infty, \text{ to } y = w(x) = 1 - \frac{2}{x+1} \rightarrow 1.$$

Asymptotą pionową jest prosta równoległa do osi  $y$  przechodząca przez punkt osobliwy  $x = -1$ .

Jeżeli  $x$  dąży do  $-1$  z lewej lub z prawej strony punktu  $x = -1$ , to wartości funkcji  $w(x)$  dążą do plus nieskończoności lub minus nieskończoności.

$$x \rightarrow -1, \text{ to } y = w(x) = w(x) = 1 - \frac{2}{x+1} \rightarrow \pm\infty.$$

Wykresem tej funkcji wymiernej jest hyperbola



Zauważmy, że ta hyperbola ma dwie asymptoty poziomą  $y = 1$  dla każdej rzeczywistej wartości zmiennej  $x \in (-\infty, \infty)$  i pionową przechodzącą przez punkt  $x = -1$ , to jest punkt w którym funkcja jest nieokreślona.

**Przykład 1.2** Rozpatrzmy funkcje wymierne

$$y = w(x) = \frac{1}{16x^2 + 1}, \quad y = w(x), \quad -\infty < x < \infty.$$

Dla funkcji wymiernej  $y = w(x)$  znajdziemy

1. dziedzinę,
2. zbiór wartości,
3. asymptoty funkcji  $y = w(x)$ ,
4. wykres funkcji  $y = w(x)$ .


Dziedziną tej funkcji wymiernej jest zbiór liczb rzeczywistych.

$$\text{Dziedzina funkcji } w(x) : D = (-\infty < x < \infty).$$

Zbiorem wartości tej funkcji jest przedział  $[1, \infty)$  liczb rzeczywistych większych lub równych od 1. Istotnie, zauważamy, że wartości tej funkcji spełniają nierówność

$$\frac{1}{16x^2 + 1} \geq 1, \text{ dla } -\infty < x < \infty.$$

Wykresem tej funkcji wymiernej jest krzywa



Funkcja wymierna

$$y = w(x) = \frac{1}{16x^2 + 1}$$

ma jedną asymptotę poziomą oś  $x$ , gdy  $y = 0$ .

**Przykład 1.3** Rozpatrzmy funkcję wymierną

$$y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}, \quad y = w(x), \quad -\infty < x < \infty.$$

Dla funkcji  $w(x)$  znajdziemy

1. dziedzinę,
2. zbiór wartości,
3. asymptoty funkcji  $y = w(x)$ ,
4. wykres funkcji  $y = w(x)$ .

Dziedziną tej funkcji wymiernej jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, gdyż mianownik  $x^2 + 1 > 1$  jest dodatni dla każdego rzeczywistego

$$x \in (-\infty, \infty).$$

Zbiorem wartości funkcji jest przedział  $[-1, 1)$  liczb rzeczywistych. Mianowicie, łatwo sprawdzamy nierówność:

$$-1 \leq \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} < 1. \quad (1.2)$$

Istotnie, funkcję  $w(x)$  można napisać w postaci różnicy

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1 - \frac{2}{x^2 + 1}$$

Dodatnia wartość wyrażenia

$$0 < \frac{2}{x^2 + 1} \leq 2$$

jest mniejsza od 2, równa 2 dla  $x = 0$ .

Ponadto

$$0 < \frac{2}{x^2 + 1} \rightarrow 0, \quad \text{gdy } x \rightarrow \pm\infty,$$

dąży do zera, jeżeli  $x \rightarrow \pm\infty$ .

Skąd otrzymujemy nierówność (1.2) przez następujące oszacowanie

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} &= 1 - \frac{2}{x^2 + 1} \\ &< 1, \quad \text{gdy } x \rightarrow \pm\infty, \end{aligned}$$


oraz

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} &= 1 - \frac{2}{x^2 + 1}, \\ &\geq -1, \quad \text{gdy } x = 0. \end{aligned}$$

Wykresem funkcji wymiernej

$$y = w(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

jest następująca krzywa:



## 1.2.2 Rozkład funkcji wymiernych na ułamki proste

Ułamkiem prostym nazywamy jedną z następujących funkcji wymiernych:

$$\frac{A}{x - a}, \quad \frac{A}{(x - a)^k}, \quad \frac{Ax + B}{x^2 + px + q}, \quad \frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^k}, \quad \Delta = p^2 - 4q < 0.$$

dla danej liczby naturalnej  $k$ , współczynników  $A, B, p, q$  i o wyróżniku  $\Delta < 0$  ujemnym.

**Przykład 1.4** Rozłóż funkcje wymierne na ułamki proste

$$w(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - 1}$$

Dla funkcji  $w(x)$  podaj

1. dziedzinę,



2. zbiór wartości ,
3. postać ułamka prostego funkcji  $y = w(x)$ ,
4. asymptoty funkcji  $y = w(x)$ ,
5. wykres funkcji  $y = w(x)$ .

**Rozwiązanie.** Dziedziną tej funkcji wymiernej jest zbiór liczb rzeczywistych dla których mianownik jest różny od zera. To znaczy

$$\begin{aligned} D &= \{x \in (-\infty, \infty) : x^2 - 1 = (x-1)(x+1) \neq 0\} \\ &= \{x \in (-\infty, \infty) : (x \neq 1) \cap (x \neq -1)\}. \end{aligned}$$

Rozkładu funkcji wymiernej na ułamki proste szukamy metodą współczynników nieoznaczonych. Mianowicie, znajdziemy  $A$  i  $B$  takie, że następująca równość zachodzi

$$w(x) = \frac{2x-1}{x^2-1} = \frac{2x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$$

dla każdego  $x \in D$  z dziedziny funkcji  $w(x)$ , to znaczy dla każdego  $x \neq -1$  i  $x \neq 1$ . Zatem, współczynniki  $A$  i  $B$  wyznaczamy z tożsamości

$$\frac{2x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$$

która jest spełniona dla każdego  $x \neq -1$  i  $x \neq 1$ .

Napiszemy tą tożsamość o wspólnym mianowniku

$$\frac{2x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A(x+1) + B(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{(A+B)x + (A-B)}{(x-1)(x+1)}$$

Porównując współczynniki przy  $x$  i wyrazy wolne w liczniku, otrzymamy równania na niewiadome  $A$  i  $B$

$$A + B = 2, \quad A - B = -1.$$

Obliczamy

$$A = B - 1, \quad (B - 1) + B = 2, \quad 2B = 3.$$

Skąd znajdujemy

$$B = \frac{3}{2}, \quad A = B - 1 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}.$$

Odpowiedź: Rozkład funkcji wymiernej  $w(x)$  na ułamki proste

$$w(x) = \frac{2x+1}{x^2-1} = \frac{3}{2(x-1)} + \frac{1}{2(x+1)}.$$

## 1.3 Zadania

**Zadanie 1.1** Dla danej funkcji wymiernej

$$w(x) = \frac{2}{x+2}, \quad x \neq -2.$$

podaj

1. dziedzinę funkcji  $w(x)$ ,
2. zbiór wartości funkcji  $w(x)$ ,
3. postać ułamka prostego funkcji  $w(x)$ ,
4. asymptoty funkcji  $w(x)$ ,
5. Naszkicuj wykres funkcji  $y = w(x)$ .

**Zadanie 1.2** Dla następującej funkcji wymiernej:

$$(i) \quad w(x) = \frac{2x - 1}{x - 2},$$

$$(ii) \quad w(x) = \frac{x - 2}{x^2 - 4},$$

podaj

1. dziedzinę funkcji  $w(x)$ ,
2. zbiór wartości funkcji  $w(x)$ ,
3. asymptoty funkcji  $w(x)$ ,
4. Rozłóż na ułamki proste funkcję  $w(x)$ ,
5. Naszkicuj wykres funkcji  $y = w(x)$ .

**Zadanie 1.3** Rozłóż funkcje wymierną na ułamki proste

$$w(x) = \frac{x^2 - 9}{(x - 3)(x^2 + 4)}$$

podaj

1. dziedzinę funkcji  $w(x)$ ,
2. zbiór wartości funkcji  $w(x)$ ,
3. asymptoty funkcji  $w(x)$ ,
4. Naszkicuj wykres funkcji  $y = w(x)$ .

